





















Der Impfplan¹ mit COMIRNATY®


| Impfstoff | Grundimmunisierung | Auffrischimpfung | Weitere Informationen |
|---|--|---|--|
| <p>COMIRNATY® Original/Omicron BA.1 15/15 µg 12+ Jahre</p> <p>(Tozinameran/ Riltozinameran)</p>  | <p>12+ Jahre*</p> <p>* Mindestens eine Grundimmunisierung mit einem COVID-19-Impfstoff</p> | <p>✓</p> <p>Dosis à 0,3 ml</p> <p>Mindestens 3 Monate</p> <p>Nächste Dosis </p> | |
| <p>COMIRNATY® Original/Omicron BA.4-5 15/15 µg 12+ Jahre Fertiglösung</p> <p>(Tozinameran/ Famtozinameran)</p>  | <p>12+ Jahre*</p> <p>* Mindestens eine Grundimmunisierung mit einem COVID-19-Impfstoff</p> | <p>✓</p> <p>Dosis à 0,3 ml</p> <p>Mindestens 3 Monate</p> <p>Nächste Dosis </p> | |
| <p>COMIRNATY® 30 µg 12+ Jahre Fertiglösung</p> <p>(Tozinameran)</p>  | <p>12+ Jahre</p> <p>✓</p> <p>2 Dosen à 0,3 ml</p> <p>1.  3 Wochen 2. </p> | <p>✓</p> <p>Dosis à 0,3 ml</p> <p>Mindestens 3 Monate</p> <p>Nächste Dosis </p> | <p>Im Rahmen der Grundimmunisierung kann eine 3. Dosis mindestens 28 Tage nach der 2. Dosis bei Personen mit starker Immunschwäche injiziert werden.</p> |
| <p>COMIRNATY® 30 µg 12+ Jahre Konzentrat</p> <p>(Tozinameran)</p>  | <p>12+ Jahre</p> <p>✓</p> <p>2 Dosen à 0,3 ml</p> <p>1.  3 Wochen 2. </p> | <p>✓</p> <p>Dosis à 0,3 ml</p> <p>Mindestens 3 Monate</p> <p>Nächste Dosis </p> | <p>Im Rahmen der Grundimmunisierung kann eine 3. Dosis mindestens 28 Tage nach der 2. Dosis bei Personen mit starker Immunschwäche injiziert werden.</p> |
| <p>COMIRNATY® 10 µg 5–11 Jahre Konzentrat</p> <p>(Tozinameran)</p>  | <p>5–11 Jahre</p> <p>✓</p> <p>2 Dosen à 0,2 ml</p> <p>1.  3 Wochen 2. </p> | <p>✓</p> <p>Dosis à 0,2 ml</p> <p>Mindestens 6 Monate</p> <p>Nächste Dosis </p> | <ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen der Grundimmunisierung kann eine 3. Dosis mindestens 28 Tage nach der 2. Dosis bei Personen mit starker Immunschwäche injiziert werden. Wird ein Kind zwischen den beiden Dosen der Grundimmunisierung 12 Jahre alt, sollte es auch die 2. Dosis der Impfserie zu 10 µg erhalten. |
| <p>COMIRNATY® 3 µg 6 Monate – 4 Jahre Konzentrat</p> <p>(Tozinameran)</p>  | <p>6 Monate – 4 Jahre</p> <p>✓</p> <p>3 Dosen à 0,2 ml</p> <p>1.  3 Wochen 2.  Frühestens 8 Wochen 3. </p> | | <p>Wird ein Kind zwischen den Dosen 5 Jahre alt, sollte es auch die noch verbleibenden Dosen der Impfserie zu 3 µg erhalten.</p> |

✓ Zulassung

Quelle
1 COMIRNATY® aktuelle Fachinformation des jeweiligen Impfstoffs

COVID-19-mRNA-Impfstoff COMIRNATY®

Weitere Informationen für Sie



QR-Code scannen
und direkt die passenden
Informationen finden!



Fachinformation

Alle Produktmerkmale und
Anwendungshinweise finden
Sie unter:

fachinformation.biontech.de



Handlungsempfehlungen

Alle Handlungsschritte und weitere
Informationen finden Sie unter:
praxis.comirnaty.de



BioNTech Kundenservice

Tel: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

E-Mail: service@biontech.de

Montag bis Freitag: 08:00–19:00 Uhr
service.biontech.de